


결핵의 정의




1 결핵이란?

- 결핵균의 감염에 의해 발생하는 호흡기 감염병입니다. 주로 폐에 발생하지만 다른 신체 부위에도 질환을 일으킬 수 있습니다.



2 결핵은 어떻게 감염되나요?

- 전염성 폐결핵환자의 기침, 재채기 또는 대화 등으로 배출된 결핵균이 공기를 통해 다른 사람의 폐로 들어가게 되면 결핵균에 감염됩니다.



질문과 답변 (Q&A)

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



KOREAN
(한국어)

Q1 결핵의 치료비용은?

A1 (건강보험 가입자)

결핵 치료가 끝날 때까지 치료비는 **전액 무료**입니다.

* 단, 식대, 일부 비급여 항목 등은 본인부담금 발생 가능

(건강보험 미가입자)

결핵 치료비는 **전액 본인부담**이지만, **보건소 또는 국립결핵병원***에서는 **무료로 치료**받을 수 있습니다.

* 단, 식대, 일부 비급여 항목 등은 본인부담금 발생 가능

* 단기 또는 무자격 체류 중 다제내성결핵으로 진단된 경우 예산 범위 내에서 전염성 소실 시까지 지원 가능

국립결핵병원 안내


국립마산병원



경남 창원시 마산합포구
가포로 215

☎ 055-249-5051

국립목포병원



전남 목포시 신지마을
1길 75

☎ 061-280-1114

Q2 귀국하여 본국에서 결핵 치료를 받고 싶습니다. 출국하면 한국에 재입국이 불가능한가요?

A2

아닙니다. 귀국 후 본국에서 결핵 치료를 지속하시고 치료를 완료한 사실이 확인*되면 한국에 재입국이 가능합니다.

* 본국 주재 대한민국 대사관(영사관)을 통해 치료완료 증명서류 제출 필요

Q3 결핵 치료를 임의로 중단하거나 치료에 순응하지 않는 경우 어떻게 되나요?

A3

대한민국에서 결핵 치료 중 **‘치료 비순응’** 또는 **‘치료 중단’**을 하는 경우 **중점관리대상자로 등록**됩니다.

관리 보건소에서 입원명령 등의 조치를 할 수 있으며, **출국이 확인***된 경우 **입국금지 조치****가 취해질 수 있습니다.

* 관리보건소에서는 질병관리청(또는 출입국관리사무소)을 통해 출입국기록을 조회하여 본국으로 귀국 여부를 확인

** **본국에서 결핵치료를 완료한 사실이 확인**(본국 주재 대한민국 대사관(영사관)을 통해 치료완료 증명서류 제출 필요)되면 입국금지 해제 가능

외국인 결핵환자를 위한

결핵

치료관리 안내



Tuberculosis

질병관리청

결핵 ZER00

치가능한
결핵

결핵 검진

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



1 결핵의 주요 증상은?



2주 이상 기침



체중감소



발열



야간발한



전신무력감



식욕부진

2 결핵이 의심되면 어떻게 해야 하나요?

- 가까운 보건소나 의료기관을 방문하여 결핵검진을 받아보세요.

결핵검진 비용

보건소



무료

의료기관



검진자 본인부담

3 결핵 검진 시 어떤 검사를 받나요?



① 흉부X선 검사

- 결핵 진단을 위한 기본 검사입니다.
- 검사결과 '결핵의심' 소견이 나온 경우, 가래검사를 통해 결핵 여부를 확인해야 합니다.



② 가래검사

- 가래를 채취하여 결핵균이 있는지 여부를 확인하는 검사입니다.
- 결핵으로 진단받은 경우, 반드시 치료를 해야 합니다.

결핵 치료

KOREA DISEASE CONTROL AND PREVENTION AGENCY



1 감수성 결핵의 치료

- 결핵은 보통 6개월 이상 꾸준히 치료받으면 완치할 수 있습니다. 치료 도중에 증상이 나아져서 임의로 약을 중단하거나 병원에 방문하지 않으면 재발할 수 있기 때문에 담당 의료진이 치료가 완료되었다고 판단할 때까지 치료를 받아야 합니다.

YH

이소니아지드

YH R 150

리팜핀

YH 리팜핀

YH

에탐부톨

PZM

피라진아미드

bcwp

튜비스정

* 감수성결핵 치료약제



전염성 결핵환자 감염관리 수칙

- 환기가 잘 되는 독립된 방 혼자 사용
- 기침, 재채기할 땐 휴지로 입과 코를 가리고, 사용한 휴지는 뚜껑이 있는 휴지통에 버려요
- 진료 등 외출 시에는 반드시 마스크 착용

2 다제내성결핵의 치료

- 다제내성결핵은 감수성결핵보다 치료기간이 길고 (보통 6개월~20개월) 치료약제 구성도 복잡합니다. 경험이 많은 전문 의료진에게 치료받을 것을 권고합니다.

다제내성결핵이란?

결핵 치료에 흔히 사용하는 두 가지 강력한 결핵약제(이소니아지드, 리팜핀)에 내성이 생긴 결핵을 의미합니다.

다제내성결핵은 왜 생기나요?

처음부터 다제내성결핵균에 감염되거나, 환자가 처방대로 약을 규칙적으로 복용하지 않거나 조기에 중단할 때 생길 수 있습니다.

다제내성결핵 전문의료기관 안내

